


Jūs ar jūsų vaikas serga diabetu ir gydosite insulino terapija.  
Insuliną leidžiate kasdien, tačiau dažnas tą pačią adatą  
naudojate kelis kartus.

## KAS ATŠITINKA, KAI NEKEIČIATE ADATOS KIEKVIENĄ KARTĄ LEISDAMIESI INSULINĄ?



**GYDYMAS GALI BŪTI NEVEIKSMINGAS dėl:**

- Kristalų susidarymo<sup>1,2</sup>
- Lipodistrofijos<sup>1-5</sup>




**GYDYMAS YRA SKAUSMINGAS, nes:**

- Adatos galiukas yra pažeistas<sup>1,4,6</sup>
- Adata nebėra sutepta<sup>1</sup>



**INFEKCIJOS RIZIKA, kai:**

- Adata nebėra sterili<sup>1,3,4</sup>



**„1“ yra paslaptis.**

**1 adata = 1 injekcija**



Sveikatos apsaugos ministro įsakymu  
nuo 2018-12-28 **VAIKAMS**,  
sergantiems I tipo cukriniu diabetu ir naudojantiems  
specialų švirkštiklį insulinui suleisti,  
**KOMPENSUOJAMA**  
**IKI 2-jų INSULINO ADATŲ PER PARĄ<sup>6</sup>**

ŠALTINIAI: 1. The Importance of Good Insulin Injection Practices in Diabetes Management - Richard Dolinar, MD, 2009. 2. Hanas R. (1999). Insulin-Dependent Diabetes in Children, adolescents and Adults. Uddevala, Sweden. 3. I. V. Misnikova, A. V. Dreval, V. A. Gubkina, E. V. Rusanova; The Risks of Repeated Use of Insulin Pen Needles in Patients with Diabetes Mellitus; Journal of Diabetology, 2011. 4. Insulin Administration; DIABETES CARE, VOLUME 27, supplement 1, 2004. 5. King L (2003) subcutaneous insulin injection technique. Nursing standard. 17, 34, 45-52 6 - OSDI statement - 2011/2012 - Diabetological Assistance Recommendations. 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo 2018-12-21. Nr. V-1508.